

殺菌剤
ベンレート水和剤
ベノミル水和剤

平成 27 年 10 月 14 日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「キャベツ」に適用病害虫名「根朽病」を追加する。
- ・作物名「なし」、使用方法「散布」、適用病害虫名「胴枯病」の希釈倍数「2000 倍」を「2000～3000 倍」に変更する。
- ・作物名「かき」に適用病害虫名「すす点病」を追加する。
- ・作物名「うめ」および「あんず」の適用病害虫名「すす斑症」を「すす斑病」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ベノミル を含む 農薬の 総使用回数
キャベツ	菌核病 根朽病	2000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	6 回以内	散布	7 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 6 回以内)
なし	輪紋病 黒星病 うどんこ病 心腐れ症 (胴枯病菌) 胴枯病	2000～ 3000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	4 回以内	散布	6 回以内 (塗布は 2 回以内、 散布は 4 回以内)
かき	落葉病 うどんこ病 炭疽病 すす点病	2000～ 3000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	6 回以内	散布	6 回以内
うめ あんず	黒星病 すす斑病	3000 倍	200～700 L/10a	収穫 7 日前 まで	1 回	散布	1 回

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社