

植物成長調整剤  
**STジベラ錠**  
ジベレリン水溶剤

平成 28 年 4 月 20 日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「ぶどう（2倍体欧州系品種）[無核栽培]」を「ぶどう（シャインマスカットを除く2倍体欧州系品種）[無核栽培]」と「ぶどう（シャインマスカット）[無核栽培]」に分離する。
- ・作物名「ぶどう（シャインマスカット）[無核栽培]」に使用目的「果房伸長促進」を追加し、ジベレリンを含む農薬の総使用回数「2回以内、但し降雨等により再処理を行う場合は合計4回以内」を「3回以内、但し降雨等により再処理を行う場合は合計5回以内」に変更する。

作物名	使用目的	使用濃度	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
ぶどう (シャインマスカットを除く 2倍体 欧州系品種) [無核栽培]	無種子化 果粒肥大促進	第1回目 ジベレリン 25ppm	—	満開時～満開3日後 (第1回目)及び満 開10～15日後 (第2回目)	2回、 但し降雨等 により再処 理を行う場 合は合計 4回以内	第1回目：花房浸漬 第2回目：果房浸漬	2回以内、 但し降雨等 により再処 理を行う場 合は合計 4回以内
		ジベレリン 25ppm					
ぶどう（シャイ ンマスカット） [無核栽培]	無種子化 果粒肥大促進	第1回目 ジベレリン 25ppm	—	満開時～満開3日後 (第1回目)及び満 開10～15日後 (第2回目)	2回、 但し降雨等 により再処 理を行う場 合は合計 4回以内	第1回目：花房浸漬 第2回目：果房浸漬	3回以内、 但し降雨等 により再処 理を行う場 合は合計 5回以内
		ジベレリン 25ppm					
	果房伸長促進	ジベレリン 3～5ppm	30～100 L/10a	展葉 3～5枚時	1回	花房散布	

次頁へ続く

前頁より続く

- ・作物名「ぶどう（キングデラ、ハニーシードレス、BK シードレスを除く3倍体品種）」に使用目的「果房伸長促進」を追加し、ジベレリンを含む農薬の総使用回数「2回、但し降雨等により再処理を行う場合は合計4回以内」を「3回以内、但し降雨等により再処理を行う場合は合計5回以内」に変更する。

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
ぶどう（キングデラ、ハニーシードレス、BKシードレスを除く3倍体品種）	着粒安定 果粒肥大促進	第1回目 ジベレリン 25～50ppm 第2回目 ジベレリン 25～50ppm	—	満開時～満開3日後 （第1回目）及び 満開10～15日後 （第2回目）	2回、 但し降雨等 により再処 理を行う場 合は合計 4回以内	第1回目：花房浸漬 第2回目：果房浸漬	3回以内、 但し降雨等 により再処 理を行う場 合は合計 5回以内
	果房伸長促進	ジベレリン 3～5ppm	30～100 L/10a	展葉 3～5枚時	1回	花房散布	

- ・作物名「すだち」の使用目的「果皮の緑色維持」の使用濃度「ジベレリン10～25ppm」を「ジベレリン5～25ppm」に変更する。

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
すだち	果皮の緑色 維持	ジベレリン 5～25ppm	50～400 L/10a	収穫予定7～30日前	1回	果実散布	1回

- ・作物名「りんどう」の使用目的「生育促進」に使用液量「1株当たり5～10mL」、使用時期「収穫後」、使用方法「切株散布」を追加する。

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
りんどう	発芽促進	ジベレリン 50～200ppm	—	は種前	1回	種子浸漬	2回以内 （種子への処 理は1回以 内、は種後は 1回以内）
	生育促進	ジベレリン 100ppm	50～150 L/10a	定植直前または 定植1～5週間後		茎葉散布	
			1株当り 5～10 mL	収穫後		切株散布	

- ・作物名「ソリダゴ」を追加する。

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
ソリダゴ	生育促進	ジベレリン 25ppm	1株当り 1mL	活着直後 又は萌芽期	1回	茎葉散布	1回

次頁へ続く

前頁より続く

#### 使用上の注意事項の変更

「花き」の「りんどう」

「切株散布する場合は、翌年の萌芽に影響を与えないよう散布後は生育期間を十分に確保すること。」を追加する。

「花き」の「ソリダゴ」

「高温期の処理では効果を示さないので、低温期（11～3月頃）に処理すること。」

「処理により草丈および切り花重がやや低下することがある。」を追加する。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社