

除草剤

ゼータタイガー 1キログラム粒剤

プロピリスルフロン・ブロモブチド・ペントキサゾン粒剤

平成28年11月30日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「オモダカ」、「コウキヤガラ」および「アオミドロ・藻類による表層はく離」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」の使用方法「湛水散布」に「無人ヘリコプターによる散布」を追加し、「湛水散布又は無人ヘリコプターによる散布」に変更する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マハイ ホウライ ハオモダカ ミズガヤリ ウリカ ホダカ クダマ コキヤガラ ヒムソ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	1kg/10a	1回	田植同時 散布機で 施用	2回以内	2回以内	2回以内
	移植直後～ ルイ3葉期 ただし、 移植後30日 まで	湛水散布 又は 無人ヘリ コプターに よる散布						

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【変更前】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、クログワイは発生始期までが本剤の散布適期である。
- ・クログワイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。

【変更後】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期までアオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期である。(変更)
- ・本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、次の注意を守ること。
 - ・散布は散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
 - ・専用の粒剤散布装置によって湛水散布すること。
 - ・事前に薬剤の物理性に合わせて粒剤散布装置のメタリング開度を調整すること。
 - ・散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整し、ほ場の端から5m離れた位置からほ場内に散布すること。
 - ・水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。(追加)
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないのので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。(変更)

【変更前】

- ・水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- ・散布後は水管理に注意すること。

【変更後】

- ・水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- ・無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。
- ・散布後は水管理に注意すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社