

## 殺虫殺菌剤

## ブラシンジョーカーフロアブル

シラフルオフエン・フェリムゾン・フサライド水和剤

平成28年12月14日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「稲」の希釈倍数「1000倍」に適用病害虫名「内穎褐変病」および「もみ枯細菌病」を追加する。

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シラフルオフエンを含む農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウカ類 ツマゲ・ロコバイ カムシ類	300倍	25L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内	3回以内
	いもち病 ウカ類 カムシ類	8倍	800mL/10a			無人ヘリコプターによる散布			
	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 変色米(アルカリ菌) 変色米(エビコカ菌) 変色米(カブライ菌) 内穎褐変病 もみ枯細菌病 コブノメイガ ウカ類 ツマゲ・ロコバイ カムシ類	1000倍	60~150L/10a			散布			

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社