

殺菌剤

ベンレート水和剤

ベノミル水和剤

平成 29 年 1 月 11 日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「らっかせい」の希釈倍数「2000倍」に適用病害虫名「茎腐病」を追加する。
- ・作物名「なす」の使用法「散布」、希釈倍数「2000倍」に適用病害虫名「褐紋病」を追加する。
- ・作物名「かき」に適用病害虫名「疑似炭疽病」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・作物名「かのこそう」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ベノミル を含む 農薬の 総使用回数
らっかせい	褐斑病 黒渋病	2000～ 3000 倍	100～300 L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 4 回以内)
	そうか病 茎腐病	2000 倍					
なす	半身萎凋病	500 倍	200～300 mL/株	定植後～ 収穫 14 日 前まで	3 回以内	土壌灌注	4 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 3 回以内)
		1000 倍	400～600 mL/株				
	黒枯病 灰色かび病 菌核病 褐紋病	2000～ 3000 倍 2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで		散布	
かき	落葉病 うどんこ病 炭疽病 すす点病	2000～ 3000 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで	6 回以内	散布	6 回以内
	疑似炭疽病	2000 倍					
かのこそう	半身萎凋病	160 倍	—	植付前	1 回	30 分間 苗浸漬	1 回

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社