

殺虫剤
ディアナSC
スピネトラム水和剤

平成29年2月22日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲」に適用病害虫名「ニカメイチュウ」を追加する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイを除く）」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類（チンゲンサイを除く）」を「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイを除く）」および「こまつな」に変更し、作物名「こまつな」に適用病害虫名「アザミウマ類」および「アオムシ」、希釈倍数「2500倍」を追加する。
- ・作物名「カリフラワー」に適用病害虫名「アザミウマ類」および「アオムシ」を追加する。
- ・作物名「なばな類」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加する。
- ・作物名「ピーマン」、希釈倍数「2500～5000倍」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加する。
- ・作物名「いちご」に適用病害虫名「コナジラミ類」および「クロバネキノコバエ類」、希釈倍数「2500倍」を追加する。
- ・作物名「茶」に適用病害虫名「ニトベミノガ」を追加する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（りんどうを除く）」および「りんどう」に適用病害虫名「コナジラミ類」、希釈倍数「2500倍」を追加する。
- ・作物名「かぼちゃ」および「樹木類」を追加する。

次頁へ続く

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ｽﾍﾟｯﾄﾙ を含む農薬の 総使用回数			
稲	イソトムシ コブノメイガ フタホビコヤガ コメイチユ	4000～ 6000倍	60～150 L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田での散布は 2回以内)			
非結球あぶらな科 葉菜類(こまつな、 チンゲンサイを除く)	コガ ハスモンヨトウ	2500～ 5000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで			2回以内	2回以内		
こまつな	アザミウマ類 アトムシ	2500倍								
カリフラワー	コガ アザミウマ類 アトムシ	2500～ 5000倍								
なばな類	コガ ハスモンヨトウ									
ピーマン	コナジラミ類	2500倍								
	アザミウマ類 材木コガ ハスモンヨトウ	2500～ 5000倍								
いちご	アザミウマ類 ハスモンヨトウ									
	コナジラミ類 クワバネソウコガ イ類	2500倍								
茶	チャノキイロアザミウマ チャノカクモハマキ チャノホコガ チャハマキ ヨモギエダシヤク チャトゲコナジラミ ニベミガ	2500～ 5000倍							200～400 L/10a	摘採前日 まで
花き類・観葉植物 (りんどうを除く)	アザミウマ類 材木コガ ハモグリバエ類	2500～ 5000倍			100～300 L/10a	発生初期			2回以内	2回以内
	コナジラミ類	2500倍								
りんどう	アザミウマ類 材木コガ ハモグリバエ類	2500～ 5000倍								
	リンドウホリハマキ コナジラミ類	2500倍								
かぼちゃ	ハスモンヨトウ	2500～ 5000倍		収穫前日 まで						
樹木類	ハマキムシ類	5000倍	200～700 L/10a	発生初期						

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

- ・「街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。」を追加する。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社