

殺虫剤
ロビンフッド
フェンプロパトリンエアゾル

平成29年4月26日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「果樹類（かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、マンゴー、いちょう（種子）、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、食用つばき（種子）を除く）」を追加する。
- ・作物名「なし」に適用病害虫名「カミキリムシ類」を追加する。

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンロパトリンを含む農薬の総使用回数
果樹類 (かんきつ、りんご、なし、びわ、もも、うめ、おうとう、ぶどう、かき、マンゴー、いちょう(種子)、くり、ペカ、アモド、くるみ、食用つばき(種子)を除く)	かきりん類	収穫前日まで	2回以内	樹幹・樹枝の食入孔にズルを差し込み噴射	2回以内
かんきつ	かきりん類				6回以内 (噴射は2回以内、 散布及びくん煙は 合計4回以内)
りんご なし					4回以内 (噴射は2回以内、 散布は2回以内)
びわ	かきりん類				6回以内 (噴射は2回以内、 散布及びくん煙は 合計4回以内)
もも					7回以内 (噴射は2回以内、 散布は5回以内)
うめ					5回以内 (噴射は2回以内、 散布は3回以内)
おうとう					4回以内 (噴射は2回以内、 散布は2回以内)
ぶどう					4回以内 (噴射は2回以内、 散布及びくん煙は 合計2回以内)
かき					5回以内 (噴射は2回以内、 散布は3回以内)
マンゴー					4回以内 (噴射は2回以内、 散布は2回以内)

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社