

殺菌剤
スタウト顆粒水和剤
イソチアニル水和剤

平成29年5月17日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「白葉枯病」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「いもち病」に希釈倍数「400倍」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「もみ枯細菌病」の使用時期「移植当日」を「は種時覆土前～移植当日」に変更し、希釈倍数「400倍」を追加する。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	白葉枯病	200倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り500mL	は種時覆土前	1回	灌注	3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田では2回以内)
		400倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り1000mL				
	いもち病 もみ枯細菌病	200倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り500mL	は種時覆土前 ～移植当日			
		400倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り1000mL				

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社