

## 除草剤

## ゴエモン1キログラム剤

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・プロモブチド粒剤

平成29年8月30日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「直播水稻」に適用雑草名「アオミドロ・藻類による表層はく離」を追加する。
- ・作物名「直播水稻」の使用時期「稲1葉期～ノビエ2葉期 ただし、収穫90日前まで」を「稲1葉期～ノビエ2.5葉期 ただし、収穫90日前まで」に変更する。

## 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	イプフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数	プロモブチドを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバ オシロイ ウリカ ミズガヤツリ ヘオモダカ ヒムシロ セリ オモダカ クダマ コウキガサ シズイ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	1kg/10a	1回	田植同時 散布機で 施用	2回以内	2回以内	2回以内
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日 まで			湛水散布 又は 無人ヘリコプタ ーに よる散布			
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバ オシロイ ウリカ ミズガヤツリ ヒムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前 まで						

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社