

除草剤

ゼータタイガーフロアブル

プロピリスルフロン・ブロモブチド・ペントキサゾン水和剤

平成29年8月30日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「エゾノサヤヌカグサ」および「シズイ」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マバイ ホムイ ヘチマカ ミズガヤリ ウカカ エゾノサヤヌカグサ ホダカ クダマ コトコガラ シズイ ヒルメ セリ アオドロ・藻類による 表層はく離	移植後3日～ バエ3葉期 ただし、 移植後30日 まで	500mL /10a	1回	原液湛水散 布、 水口施用 又は 無人ヘリ コプター による 滴下	2回以内	2回以内	2回以内

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【変更前】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失しないように散布すること。
なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。
ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは4葉期まで、ヒルムシロは発定期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発定期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発定期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。

【変更後】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失しないように散布すること。
なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。
ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは4葉期まで、ヒルムシロは発定期まで、セリは再生前から再生始期まで、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発定期まで、シズイは草丈3cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発定期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。