

除草剤

ゼータタイガージャンボ

プロピリスルフロン・ブロモブチド・ペントキサゾン粒剤

平成29年8月30日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「シズイ」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マブイ ホムイ ヘオモガカ ミズガヤリ ウカ ホガカ クガワ コサカ シズイ ヒルム セリ アオドロ藻類による 表層はく離	移植後3日～ ルビ3葉期 ただし、 移植後30日 まで	小包装 (パック) 10個 (300g) /10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま投げ 入れる。	2回以内	2回以内	2回以内

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【変更前】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように使用すること。
なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するよう注意すること。
ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは4葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の使用適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。

【変更後】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失ないように使用すること。
なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するよう注意すること。
ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは4葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の使用適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。