

殺虫剤
アディオンフロアブル
ペルメトリン水和剤

平成30年1月17日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「すもも」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「かき」を追加する。
- ・使用液量の欄を追加する。

前頁より続く
【変更後】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈 倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | ペルメトリン を含む 農薬の 総使用回数 | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------------------------|------|------|------|
| 大粒種ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 1000～ 2000倍 | 200～700 L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 | | | |
| | コガネムシ類 フタテンメコバエ | 1500倍 | | | | | | | | |
| おうとう | オウトウハマダマミバエ ショウジョウバエ | 2000倍 | | 収穫前日まで | 2回以内 | | | 2回以内 | | |
| もも | モモガガリガ | 1500～ 2000倍 | | 収穫7日前まで | 6回以内 | | | 6回以内 | | |
| | シクイムシ類 アブラムシ類 | 1500倍 | | 収穫前日まで | 2回以内 | | | 2回以内 | | |
| すもも | アブラムシ類 | | | | | | | | | |
| りんご | キンモンホガ | 1500～ 2000倍 | | 収穫14日前まで | | | | | 2回以内 | 2回以内 |
| | ケムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類 モモヨウキリゾウムシ シクイムシ類 | 1500倍 | | | | | | | | |
| なし | シクイムシ類 カメムシ類 | 1500～ 2000倍 | | 収穫前日まで | | | | | | |
| | アブラムシ類 | | | | | | | | | |
| くるみ | アメリカロビトリ シロテンクロマイカ | 1500倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | | 5回以内 | | | | |
| マルメ | シクイムシ類 | 収穫14日前まで | | | | | | | | |
| ブルーベリー | オウトウショウジョウバエ | 2000倍 | 収穫前日まで | | | | | | | |
| かき | アザミウマ類 カメムシ類 | 1000～ 1500倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | | 5回以内 | | | | |
| アスパラガス | ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1500倍 | 100～500 L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | | | | |
| きく ばら カーネーション | アブラムシ類 | | 100～300 L/10a | — | 6回以内 | 6回以内 | | | | |
| 宿根かすみそう | アブラムシ類 ヨトウムシ | | | | | | | | | |
| スターチス | ヨトウムシ | | | | | | | | | |
| りんどう | リンドウハダマキ ヒラスハアザミウマ | | | | | | | | | |
| トルコギキョウ | ヒラスハアザミウマ | | | | | | | | | |
| つつじ類 | ツツジゲンバエ | | | | | | 200～700 L/10a | | | |

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社