

殺虫剤
ロビンフッド
フェンプロパトリンエアゾル

平成30年1月17日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「ぶどう」に適用病害虫名「クビアカスカシバ」を追加する。
- ・作物名「花き類・観葉植物」を追加する。
- ・作物名「かえで」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンプロパトリンを含む農薬の総使用回数
ぶどう	クビアカスカシバ カキムシ類	収穫前日まで	2回以内	樹幹・樹枝の食入孔に ノズルを差し込み 噴射	4回以内 (噴射は2回以内、 散布は2回以内)
花き類・観葉植物	アブラムシ類	-	6回以内	噴射	6回以内
かえで	ゴマダカミキリ	-	6回以内	樹幹・樹枝の食入孔に ノズルを差し込み 噴射	6回以内

使用上の注意事項の変更

【変更前】

- ・樹木類のケムシ類に使用する場合、植物体への近接噴射は冷害を生じるおそれがあるので、30cm以上離れた所から1～3秒間ずつ断続して茎葉が濡れる程度に噴射すること。特に新芽、新葉、蕾、花卉には十分注意すること。
- ・適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【変更後】

- ・樹木類のケムシ類および花き類・観葉植物に使用する場合、植物体への近接噴射は冷害を生じるおそれがあるので、30cm以上離れた所から1～3秒間ずつ断続して茎葉が濡れる程度に噴射すること。特に新芽、新葉、蕾、花卉には十分注意すること。
- ・適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社