

殺菌剤
STダコニール1000
TPN水和剤

平成30年6月13日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「あしたば」、適用病害虫名「黒枯病」を追加する。
- ・作物名「いちじく」に適用病害虫名「さび病」を追加する。
- ・作物名「レタス」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（ばらを除く）」、「ばら」、「ゆり」に適用病害虫名「斑点病」を追加し、作物名「きく」に適用病害虫名「白さび病」、「斑点病」、「うどんこ病」を追加する。

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
あしたば	黒枯病	1000倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
いちじく	疫病、黒葉枯病、黒かび病、さび病	2000倍	200~700L/10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内
レタス	灰色かび病、すそ枯病、べと病	1000倍	100~300L/10a	収穫14日前まで	3回以内		5回以内(土壌灌注は2回以内、散布は3回以内)
きく	黒斑病、褐斑病、白さび病、うどんこ病、斑点病			—	6回以内		6回以内
ばら	黒星病、うどんこ病、斑点病						
ゆり	葉枯病、斑点病						
花き類・観葉植物(ばら、きく、チューリップ、ゆり、りんどうを除く)	うどんこ病、斑点病						

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社