

平成30年10月10日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が平成30年10月10日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フロンサイドSC」

(農林水産省登録 第18751号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「キャベツ」(適用病害名：菌核病)、使用方法「全面土壌散布」を追加。
2. 作物名「キャベツ」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数「2回以内(苗床では1回以内、本圃では1回以内)」を「3回以内(苗床では1回以内、本圃での土壌混和は1回以内、土壌散布は1回以内)」に変更。
3. 作物名「やまのいも」(適用病害名：褐色腐敗病)、使用方法「全面散布土壌混和」を追加。
4. 作物名「やまのいも」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数「4回以内」を「5回以内(植付前の土壌混和は1回以内、植付後の散布は4回以内)」に変更。
5. 「使用上の注意事項」について(14)及び(19)を以下のとおり変更。
 - (14) キャベツ、はくさい、レタス及び非結球レタスの全面土壌散布では、初期生育の遅延を生じることがあるが、その後回復し、作物の生育、収量に影響はない。
(定植の多雨または、過度の灌水条件で発生しやすい)
 - (19) 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

— 次ページに続く —

【 適用病害名と使用方法 】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルジナムを含む 農薬の総使用回数
やまのいも	葉渋病	2,000	100~300	収穫7日前 まで	4回以内	散布	5回以内 (植付前の土壌混和は 1回以内、植付後の 散布は4回以内)

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルジナムを含む 農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
やまのいも	褐色腐敗病	500m l /10a	100~200 L/10a	植付前	1回	全面散布 土壌混和	5回以内 (植付前の土壌混和は 1回以内、植付後の 散布は4回以内)
キャベツ	苗立枯病 (リゾクトニア菌) 菌核病 根こぶ病	500m l /10a	100~200 L/10a	は種又は 定植前	2回以内 (苗床では 1回以内 本圃では 1回以内)	全面散布 土壌混和	3回以内 (苗床では1回以内、本圃 での土壌混和は1回以内、 土壌散布は1回以内)
	菌核病			定植前	1回	全面土壌 散布	

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336