

## 除草剤

## ゼータタイガージャンボ

プロピリスルフロンのプロモブチド・ペントキサゾン粒剤

平成30年11月21日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「エゾノサヤヌカグサ」を追加する。
- ・作物名「直播水稻」を追加する。

## 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	プロピリスルフロンのを含む農薬の総使用回数	プロモブチドを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンのを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホトケルシ ヘチマ ミズガヤツリ ウリカ エゾノサヤヌカグサ オモミ クダマ コキヤガラ シイ ヒルムシロ セリ アミドロ・藻類による 表層はく離	移植後3日～ ルネ3葉期 ただし、 移植後30日 まで	小包装 (パック) 10個 (300g) /10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま投げ 入れる。	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホトケルシ ミズガヤツリ ウリカ ヒルムシロ セリ アミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ルネ3葉期 ただし、 収穫90日前 まで						

次頁へ続く

前頁より続く

#### 使用上の注意事項の変更

##### 【変更前】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように使用すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するよう注意すること。

ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは4葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の使用適期である。

##### 【変更後】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように使用すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するよう注意すること。

ホタルイ、ウリカワ（ただし、直播水稻は2葉期まで）、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは4葉期まで（ただし、直播水稻は3葉期まで）、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の使用適期である。（変更）

- ・稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しないこと。（追加）

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社